



Gestione del paziente con disturbi funzionali pelvici durante emergenza sanitaria da Covid-19

Note:

- *quanto sotto riportato non ha valore di Linea Guida ma semplicemente di suggerimento comportamentale e sarà oggetto di aggiornamento costante in funzione dell'evoluzione dell'emergenza.*
- *quanto sotto riportato non ha valore di Linea Guida ma semplicemente di suggerimento comportamentale e sarà oggetto di aggiornamento costante in funzione dell'evoluzione dell'emergenza:*
- *qualora necessarie valutazioni cliniche in presenza, raccomandare ove possibile strutture che garantiscono percorsi NO Covid; qualora necessario trattamento chirurgico prevedere screening Covid preoperatorio laboratoristico e garantire percorso NO Covid*

A cura di Alessandro Giammò e Francesco Savoca

| argomento | Suggerimenti | note |
|--|---|-------------|
| PAZIENTE CON IMPIANTO PROTESICO PER INCONTINENZA MASCHILE | | |
| DOLORE, TUMEFAZIONE, DISURIA, EMATURIA | CONSULTO TELEFONICO Indagare sulla sede del dolore, ossia a quale componente protesico si riferisce (pompa o port, perineo ecc..), se associato a tumefazione o se compare un arrossamento cutaneo. Indagare su una eventuale comparsa di disuria improvvisa e/o Ematuria. Quando possibile farsi inviare documentazione fotografica. | |



| | | |
|---|--|--|
| | <p>Tali sintomi, variamente rappresentati devono far supporre una infezione che può essere associata o meno ad una erosione.</p> <p>Impostare una terapia antibiotica ad ampio spettro</p> <p>Rivalutare telefonicamente il paziente dopo 7 gg</p> <ul style="list-style-type: none">• In caso di remissione, proseguire con il follow-up telefonico• In caso di persistenza della sintomatologia programmare visita urgente. | |
| <p>Estrusione di un componente protesico (port, pompa)</p> | <p style="text-align: center;">CONSULTO TELEFONICO</p> <p>Confermata telefonicamente l'esteriorizzazione di parte del sistema protesico si consiglia di impostare una terapia antibiotica ad ampio spettro ed effettuare medicazioni giornaliere. Quando possibile farsi inviare documentazione fotografica.</p> <p>Contestualmente programmare una visita di controllo urgente dal quale potranno emergere i seguenti quadri clinici:</p> <ul style="list-style-type: none">• assenza di un franco quadro infettivo: proseguire con la terapia antibiotica e con le medicazioni domiciliari sino alla programmazione non particolarmente urgente di un intervento di revisione chirurgica. | |



| | | |
|--|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none">• presenza di un concomitante quadro infettivo: programmare revisione chirurgica urgente. | |
| SINTOMI DI MALFUNZIONAMENTO DEL SISTEMA PROTESICO | | |
| Ricomparsa dell'incontinenza | <p style="text-align: center;">CONSULTO TELEFONICO</p> <ul style="list-style-type: none">• Rassicurare il paziente• Verificare la corretta dinamica della pompa (Sfintere Artificiale)•• Tale condizione non rappresenta un'urgenza | |
| Disuria | <p style="text-align: center;">CONSULTO TELEFONICO</p> <ul style="list-style-type: none">• Verificare la corretta dinamica della pompa (Sfintere Artificiale):• se vi sono difficoltà a far funzionare la pompa utile visita urgente nel sospetto di un blocco della pompa. In tale occasione potrà essere inserito un CV da personale esperto previa disattivazione del sistema.• Se la pompa sembra funzionare mantenere follow-up telefonico ogni 7 gg per cogliere una eventuale ritenzione o sospettare una iniziale erosione. | |



| | | |
|--|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none">• In caso di dispositivi che non prevedono una pompa (ProACT, Atoms, Sling ecc...) mantenere follow-up telefonico ogni 7 gg per cogliere una eventuale ritenzione o sospettare una iniziale erosione. | |
| Ritenzione Urinaria | <p>CONSULTO TELEFONICO</p> <ul style="list-style-type: none">• visita urgente durante la quale potrà essere inserito un CV da personale esperto previa disattivazione del sistema con le modalità previste per ogni tipo di dispositivo. | |
| PAZIENTE CON INCONTINENZA DOPO PROSTATECTOMIA | <p>CONSULTO TELEFONICO</p> <p>Consigliare esercizi di riattivazione perineale da eseguirsi in modo intensivo in caso di intervento recente.</p> | |
| | <ul style="list-style-type: none">• Associare Duloxetina e gestirla in base alla riposta clinica e sotto controllo dello specialista.• Valutare l'opportunità di un trattamento con antimuscarinici (se vi sono i presupposti anamnestici) <p>Tale condizione non rappresenta un'urgenza</p> | |